Envoi n° 11

LE DE FRANCE 10 mai 1994 ISSN 0767 - 5542

REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

GRANDES CULTURES

Blé

Stades:

- * sortie à dégagement de la dernière feuille dans la majorité des cas.
- * Stade 3 noeuds sur certaines situations tardives.

Oïdium

Les infestations restent très hétérogènes, seules quelques parcelles justifient d'associer un anti-oïdium au fongicide à réaliser.

Rouille brune

La situation est similaire à celle de l'an passé. On observe quelques pustules par ci par là.

Septoriose

Infos PRESEPT

Le risque donné par PRESEPT la semaine dernière est confirmé.

Les pluies du week-end ont été fortement contaminantes, provoquant une très forte augmentation du risque.

Au verso de cet Avertissement Agricole, vous constaterez que les courbes de simulation des postes météo de :

- * VILLEROY (Nord Seine et Marne)
- * VOULTON (Centre Seine et Marne)
- * ETAMPES (Sud Essonne)

témoignent de cette évolution.

A noter, qu'une situation similaire est enregistrée sur toutes les autres stations météo de notre région.

D'autre part, les contaminations enregistrées entre le 23 et 27 avril (dont nous vous parlions la semaine dernière) vont exploser dans les prochains jours.

Toutes les parcelles non traitées la semaine dernière sont à protéger de toute urgence.

Les parcelles tardives sur lesquelles la dernière feuille n'est pas dégagée peuvent voir leur traitement différé d'une semaine.

Pucerons

Leur installation est repérée en parcelle.

Il est inutile d'ajouter un insecticide au fongicide, les infestations sont très faibles.

Décolorations jaunes

Nous avons pu constater des symptômes de décolorations jaunes sur les dernières feuilles de certaines parcelles.

Après incubation en chambre humide, il s'avère que nous avons décelé la présence d'alternaria triticana. Affaire à suivre.....,

Des analyses similaires sont en cours sur des symptômes de taches brunes.

Orge d'hiver

Stade : sortie des barbes sur les parcelles les plus avancées.

Maladies

L'helminthosporiose et la rouille sont dominantes.

Protégez vos parcelles.



ministère de l'agriculture et du développement rural

D.R.A.F.

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 47, rue Paul Doumer 93100 MONTREUIL Tél : (1) 42 87 76 71 Fax : (1) 48 58 64 80 BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES



 PUBLICATION PERIODIQUE CPPAP Nº 536 AD

Betterave

Pucerons - jaunisses

La colonisation par les pucerons sur les parcelles traitées au semis avec TEMIK ou DACAMOX a débuté.

Les semis protégés avec du GAUCHO sont en revanche indemnes de pucerons.

Une première intervention insecticide est à réaliser sur les parcelles protégées avec TEMIK ou DACAMOX.

Nous vous rappelons que les semis réalisés avec un insecticide tel que CURATER ont dû être traités la semaine dernière. Si ce n'est le cas, intervenez de toute urgence.





